

Excursion ornithologique du 27 janvier 2008

par Michel Moreels

Résumé

Rendez-vous annuel, l'excursion hivernale en Zélande est toujours synonyme de belles observations. L'édition 2008 n'a pas failli à la tradition, permettant aux participants de faire la distinction entre deux espèces de phoques.

Samenvatting

Zoals elk jaar staat de winteruitstap naar Zeeland garant voor enkele mooie waarnemingen. Met de uitstap van 2008 was het niet anders en konden de deelnemers het onderscheid maken tussen twee soorten zeehonden.

La Zélande, on ne s'en lasse pas !

Nous avons été averti par d'autres ornithologues partis en Zélande depuis le début de l'année et par le remarquable site ornithologique du Dutchbirding (<http://www.dutchbirding.nl>) : le climat trop clément qui touche le sud des Pays-Bas depuis le début 2008 fait qu'il y a moins d'espèces à voir qu'auparavant. Et quant aux espèces observées, elles présentent souvent des effectifs moindres que ceux rencontrés en périodes plus froides.

Cinq sites furent visités lors de la journée.

Premier arrêt Neeltje Jans...et première déception! Cela faisait des années qu'on ne s'était plus arrêté sur cette petite île artificielle. Si le paysage vaut le déplacement, question oiseaux, cette fois, on frôla le zéro absolu.

Puis heureusement, il y eu le Brouwersdam qu'on fit pour la première fois en matinée. Et là : bingo ! A peine descendu du car, sous un temps venteux mais avec une excellente visibilité, un phoque veau marin se montra dévorant un poisson plat et ce à quelques mètres à peine du rivage (amusant de voir le phoque, dont seule la tête émergeait de l'eau, tenir le poisson entre ses pattes avant pour le dévorer).



Enfin, un phoque gris ! (Brouwersdam)
André Cosy - Copyright © 2008 CEBE-MOB

Mais le meilleur allait venir, lorsqu' à quelques encablures de celui-ci est apparu un animal beaucoup plus imposant à la tête tout à fait plate : un magnifique phoque gris qui dépassait allégrement le double-mètre. Cette observation constituait une première pour la plupart d'entre-nous. Cerise sur le gâteau, les deux animaux se sont montrés à maintes reprises tout au long de l'heure que nous sommes restés sur place, permettant à tout un chacun de bien percevoir les différences existant entre eux.

Mais il n'y avait pas que les phoques à voir. Cinq plongeurs catmarins, pas fort éloignés du rivage, se sont aussi laissés admirer sous toutes leurs coutures et identifier sans coup férir.

Les eiders à duvet, macreuses noires, harles huppés et bécasseaux violets se montrèrent aussi dans des conditions excellentes (quel plaisir pour le guide de constater que tout le monde avait pu bien les voir !). Une femelle d'harelde boréale, vue de plus loin, compléta le bilan de ce très bel arrêt.

L'après-midi, les Slikke van Flakkee -très beau paysage- offrent un certain nombre (limité quand même) d'oies et de canards.
 Près de Zierikzee, on a pu observer : l'avocette, le canard pilet...et le Zeelandbrug vu du dessous.
 Impressionnant, et propice pour les photos!
 Dernier arrêt, enfin, avec le Verse Meer qui permet surtout l'observation d'un banc de bécasseaux variables et d'un mâle de bruant des roseaux.
 Encore vu lors du trajet en car : un busard des roseaux femelle, trois busards Saint-Martin femelles et quatre oies des neiges (2 adultes, 2 immatures) partageant la compagnie d'oies cendrées.



Ornithologie ...une activité de groupe.
 Laetitia Langlet- Copyright © 2008 CEBE-MOB

Liste des espèces observées :

plongeon catmarin (5 ind.)	garrot à oeil d'or	goéland marin
grèbe huppé	harle huppé	pigeon ramier
grèbe castagneux	harelda boréale (1 fem.)	faisan de Colchide
grand cormoran	eider à duvet	faucon crécerelle
héron cendré	fuligule morillon	buse variable
aigrette garzette	macreuse noire	busard des roseaux (1 fem.)
cygne tuberculé	foulque macroule	busard Saint-Martin (3 fem.)
oie cendrée	poule d'eau	corneille noire
oie rieuse	hûtrier pie	pie bavarde
oie des neiges (4 ind.)	vanneau huppé	choucas des tours
tadorne de belon	tournepierrière à collier	étourneau sansonnet
ouette d'Egypte	courlis cendré	bruant des roseaux (1 mâle)
bernache nonette	barge rousse (1 ind.)	
bernache cravant	bécasseau variable	Et encore ... :
canard colvert	bécasseau violet (8 ind.)	phoque veau marin (1 ind.)
canard pilet	avocette élégante	phoque gris (1 ou 2 (?) ind.)
canard souchet	chevalier gambette	chevreuil
canard siffleur	mouette rieuse	lapin de garenne
sarcelle d'hiver	goéland argenté	lièvre d'Europe

Levons une fois pour toute l'équivoque phoque gris (*Halichoerus grypus*) - phoque veau marin (*Phoca vitulina*).

Le phoque veau marin est plus petit que son imposant cousin le phoque gris. (Environ 1,5 m pour le premier et une centaine de kilos, 3 m et 330 kilos pour les mâles de la seconde espèce (2,20 m et 220 kilos pour les femelles)). Outre la taille, la forme de la tête est le meilleur critère de distinction entre les deux. Le phoque veau marin a un stop (point d'intersection entre le bas du front et le début du museau) marqué comme les chiens, les narines en "V" se touchant dans le bas et un air "gentil". La tête du Phoque gris ne présente pas de stop, évoque une tête de cheval (tête, front et museau sont dans un même prolongement), les narines sont quasi-parallèles et ne se touchent pas.



...ET NOUS AVONS DONC
OBSERVÉ AUJOURD'HUI :
UN CASSE-PIEDS MOUCHETÉ
3 BOBONES À MOUSTACHES
8 HURLUBERLUS des ROSEAUX
... EST CE TOUT ?...

AH! MOI J'AI VU CINQ
MEMÈRES BABILLARDES
2 TRAQUEURS de PINTES
ET 1 GOURMET CRAMOISI

ET MOI J'AI CRU VOIR
UN DRAGUEUR À TÊTE BLANCHE
ET UNE BÉCASSINE À LORNETTE

WAT ZEGT
GE?

La CEBE en Zélande... par l'autre bout des jumelles
Raymond Beys - Copyright © 2008 CEBE-MOB